

# Beheersing van *Nesidiocoris tenuis* in tomaat

## Preventie

- Hoge *Macrolophus* populatie > afremming *Nesidiocoris*

## Monitoring

- Droge, gele vangplaat in de kop van de plant
- Elke twee weken vervangen
- 2 in gewas ~ 10 op vangplaat ~ 1 necrotische ring

## Controle

- Actie vanaf 2 *Nesidiocoris* per kop (schadedrempel)
- Spuiten in de kop
- Affirm doodt *Nesidiocoris* en spaart *Macrolophus*
- Bio-pyretrex toont sterk effect, maar ook op *Macrolophus*
- Capsanem ook effectief
- Geen verschil tussen spuiten met bovenste dop of handspuit

## Verder onderzoek nodig

- Sesam als vanggewas verlaagt *Nesidiocoris* schade, maar beperkt
- *D. errans* in combinatie met *Macrolophus* onderdrukt de *Nesidiocoris* populatie en schade
- Endofyten kunnen zorgen voor minder aantrekking, minder schade en hogere mortaliteit van *Nesidiocoris*, maar cultivar- en schimmelaafhankelijk

## Meer info?

- [Lien.Bosmans@Proefcentrum.be](mailto:Lien.Bosmans@Proefcentrum.be); [Marlies.Huysmans@Proefcentrum.be](mailto:Marlies.Huysmans@Proefcentrum.be);  
[Lisa.Herman@proefstation.be](mailto:Lisa.Herman@proefstation.be); [Caroline.Meesters@kuleuven.be](mailto:Caroline.Meesters@kuleuven.be)